



FACULTAD DE OBSTETRICIA Y ENFERMERÍA

HILDA ZORAIDA BACA NEGLIA

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

**EXPOSICIÓN AL SEMEN PATERNO Y SU ASOCIACIÓN
CON LA PREECLAMPSIA EN PACIENTES
OBSTÉTRICAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL SAN
JUAN DE LURIGANCHO, 2024**



**TESIS
PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN
OBSTETRICIA**

LIMA – PERÚ

2024



Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada
CC BY-NC-ND

El autor sólo permite que se pueda descargar esta obra y compartirla con otras personas, siempre que se reconozca su autoría, pero no se puede cambiar de ninguna manera ni se puede utilizar comercialmente.<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

REPORTE TURNITIN

Reporte de similitud

| NOMBRE DEL TRABAJO | AUTOR |
|---|-----------------------------------|
| Exposición al semen paterno y su asociación con la preeclampsia en pacientes obstétricas atendidas e | Wendi Belen Leon Pretel |
| RECUENTO DE PALABRAS | RECUENTO DE CARACTERES |
| 15160 Words | 85492 Characters |
| RECUENTO DE PÁGINAS | TAMAÑO DEL ARCHIVO |
| 84 Pages | 7.4MB |
| FECHA DE ENTREGA | FECHA DEL INFORME |
| Sep 26, 2024 3:03 PM GMT-5 | Sep 26, 2024 3:04 PM GMT-5 |

● 19% de similitud general


El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos.

- 17% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 13% Base de datos de trabajos entregados
- 2% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

● Excluir del Reporte de Similitud

- Material bibliográfico
- Coincidencia baja (menos de 10 palabras)




Dra. Victoria del Consuelo Aliaga Bravo
Jefa de la Oficina de Grados y Títulos

RESUMEN

Objetivo: Determinar la asociación entre la exposición al semen paterno y la preeclampsia en pacientes obstétricas atendidas en el Hospital San Juan de Lurigancho, 2024. **Método:** Estudio cuantitativo, analítico, observacional, prospectivo, transversal, comparativo. **Muestra:** 39 pacientes con preeclampsia y 78 pacientes sin preeclampsia. **Resultados:** Las pacientes con preeclampsia tuvieron un promedio de 1,38 coitos a la semana, mientras que en las pacientes sin preeclampsia tuvieron un promedio de 2,96 coitos a la semana ($t=-8,795$; $p=0,000$). Las pacientes con preeclampsia tuvieron un promedio de 1,56 eyaculaciones endovaginales por semana, en tanto que las pacientes sin preeclampsia tuvieron un promedio de 4,28 ($t=-9,345$; $p=0,000$). Las pacientes con preeclampsia tuvieron una cohabitación sexual promedio de 12 meses antes del embarazo en comparación con las pacientes sin preeclampsia que tuvieron un promedio de 53 meses ($t=-9,526$; $p=0,000$). Las pacientes con preeclampsia tuvieron una duración del acto sexual promedio de 9 minutos, en tanto que las pacientes sin preeclampsia tuvieron una duración del acto sexual promedio de 15 minutos ($t=-6,655$; $p=0,000$). **Conclusiones:** Las pacientes con preeclampsia tuvieron menor frecuencia de relaciones sexuales semanal, frecuencia eyacularia semanal, tiempo de cohabitación sexual y duración del acto sexual que aquellas pacientes sin diagnóstico de preeclampsia ($p=0,000$).

Palabras claves: Preeclampsia, semen, coito.

ABSTRACT

Objective: Determine the association between exposure to paternal semen and preeclampsia in obstetric patients treated at the San Juan de Lurigancho Hospital, 2024. **Method:** quantitative, analytical, observational, prospective, cross-sectional, comparative. **Sample:** 39 patients with preeclampsia and 78 patients without preeclampsia. **Results:** Patients with preeclampsia had an average of 1.38 coitus per week, while patients without preeclampsia had an average of 2.96 coitus per week ($t=-8,795$; $p=0.000$). Patients with preeclampsia had an average of 1.56 endovaginal ejaculations per week, while patients without preeclampsia had an average of 4.28 ($t=-9,345$; $p=0.000$). Patients with preeclampsia had an average sexual cohabitation of 12 months prior to pregnancy compared to patients without preeclampsia who had an average of 53 months ($t=-9,526$; $p=0.000$). Patients with preeclampsia had an average intercourse duration of 9 minutes, whereas patients without preeclampsia had an average intercourse duration of 15 minutes ($t=-6,655$; $p=0.000$). **Conclusions:** Patients with preeclampsia had lower weekly sexual intercourse frequency, weekly ejaculatory frequency, sexual cohabitation time and duration of sexual intercourse than those patients without a diagnosis of preeclampsia ($p=0.000$).

Key words: Preeclampsia, semen, age.