



**FACULTAD DE OBSTETRICIA Y ENFERMERÍA  
ESCUELA DE OBSTETRICIA**

**CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL CON VIDA  
SEXUAL ACTIVA CON BAJA COBERTURA DE PLANIFICACIÓN  
FAMILIAR DEL HOSPITAL DE VENTANILLA  
CALLAO - MAYO 2015**

**PRESENTADA POR  
NOEMI DELFIN SALAZAR**

**TESIS**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN OBSTETRICIA**

**LIMA – PERÚ**

**2016**



**Reconocimiento  
CC BY**

El autor permite a otros distribuir y transformar (traducir, adaptar o compilar) a partir de esta obra, incluso con fines comerciales, siempre que sea reconocida la autoría de la creación original.

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



**USMP**  
UNIVERSIDAD DE  
SAN MARTIN DE PORRES

FACULTAD DE  
OBSTETRICIA Y ENFERMERIA

**FACULTAD DE OBSTETRICIA Y ENFERMERIA**

**ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA**

**CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL CON VIDA  
SEXUAL ACTIVA CON BAJA COBERTURA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR  
DEL HOSPITAL DE VENTANILLA CALLAO - MAYO 2015**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN  
OBSTETRICIA**

**Presentado por:**

**Bach. Obst. Noemí Delfín Salazar**

**Asesora: Dra. Obst. Olga Ramírez Antón**

**LIMA - PERÚ**

**2015**

**CARÁCTERÍSTICAS DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL CON VIDA  
SEXUAL ACTIVA CON BAJA COBERTURA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR  
DEL HOSPITAL DE VENTANILLA CALLAO - MAYO 2015**



**ASESORA:**

Dra. . Olga Ramírez Antón


**MIEMBROS DEL JURADO :**

Dra. . Mirtha Muñoz Hidrógo

Mg. Yrene Mateo Quispe

Mg. Flor de María Chumpitaz Soriano





## DEDICATORIA

A Dios por ser mi guía y fortaleza en todo momento.

Le doy gracias a mis padres Isabel y Antero por los valores que me han inculcado y por haberme dado la oportunidad de tener una excelente educación y por ser un excelente ejemplo a seguir.

A mi esposo e hija por su amor y apoyo incondicional.

A mis hermanas Esther y Diana porque siempre están pendiente de mi mostrándome el inmenso amor que me tienen.

## AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por la vida y la oportunidad que me dió para culminar este trabajo.

A mis padres, por sus consejos para seguir perseverante y constante en mi formación como persona y profesional.

A mi esposo e hija por su amor que diariamente me demuestran y me dan la fuerza que necesito.

A mis hermanas, que con sus consejos me han ayudado a afrontar los retos que se me han presentado a lo largo de mi vida.

A Dra. Olga Ramírez Antón, gracias por la gran ayuda que me brindó , por sus enseñanzas y conocimientos para hacer posible este trabajo.

A las Obst. Judith Vásquez Vernuy, gracias por la ayuda brindada en el Hospital de Ventanilla.

## ÍNDICE

	PÁGINAS PRELIMINARES	PÁGINAS
Portada		
Título		
Dedicatoria		
Agradecimientos		
RESUMEN		
ABSTRACT		
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN		1
CAPÍTULO II: MATERIAL Y MÉTODO		4
2.1 Diseño metodológico		5
2.2 Población y muestra		5
2.3 Técnica e instrumentos de la recolección de datos		10
2.4 Técnica de procesamientos de la información		10
2.5 Aspectos éticos		11
CAPÍTULO III: RESULTADOS		12
CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN		27
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES		33
CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES		34
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS		35
ANEXOS		38

## RESUMEN

**OBJETIVO:** Determinar las características de las mujeres en edad fértil con vida sexual activa con baja cobertura de planificación familiar de Hospital de Ventanilla Callao – mayo 2015.

### **MATERIAL Y METODO:**

**Diseño:** es un estudio descriptivo de corte transversal y prospectivo

**Población:** estuvo conformada por 4507 mujeres en edad fértil con vida sexual activa.

**Muestra:** estuvo conformada por 96 mujeres en edad fértil con vida sexual activa.

**RESULTADOS:** edad 20 a 34 años 58.3%, grado de instrucción 50.0% culminaron el nivel secundario, estado civil: convivientes 53.1%, ocupación: ama de casa 55.2%. iniciaron sus relaciones sexuales :16 a 24 años 66.7% , tuvieron de 3 a 4 parejas 46.9%,multíparas 61.5% , conoce suficiente de los métodos 27.1% , indicaron que no es accesible asistir al establecimiento de salud para adquirir un método (65.6%), el horario inadecuado es una de las limitaciones que tienen para no asistir al servicio de planificación 45.8%. Las mujeres saben que la consulta y los métodos son gratuitos 99.0%; no usan actualmente ningún método 56.3%, por miedo a los efectos secundarios 39.6%.Los métodos fueron orientados por la obstetra 45.8%,

**CONCLUSIONES:** El horario inadecuado es una de las limitaciones para que las mujeres no asistan al servicio de planificación, en su mayoría respondieron que no es accesible acudir a un establecimiento de salud para adquirir un método, Sin embargo no están usando ningún método anticonceptivo por los efectos secundarios.

**PALABRAS CLAVE :** características , planificación familiar , mujeres en edad fértil

## ABSTRAC

**OBJECTIVE:** To determine the characteristics of women of childbearing age with active sex life with low coverage of family planning Hospital of Ventanilla Callao - May 2015.

### **MATERIALS AND METHOD:**

**Design:** a descriptive, prospective and cross-sectional study.

**Population:** 4507 consisted of women of childbearing age with active sexual life.

**Sample:** consisted of 96 women of childbearing age with active sexual life.

**Results:** age: 20-34 years 58.3%, level of education 50.0% completed the secondary level, marital status 53.1% live, occupation 55.2% homemakers. They started their sex: 16-24 years 66.7% had 3 to 4 couples 46.9%, multiparous 61.5%, know enough of the methods 27.1%, women indicated that is not available to attend the health facility to acquire a method 65.6%, inadequate time is one of the limitations that are not planning to attend the service 45.8%. Women know that consultation and the methods are free 99.0%; not currently using any method 56.3%, for fear of 39.6% .The side effects methods were guided by the obstetrician 45.8%

**Conclusions:** the right time is one of the limitations for women not planning to attend the service, most responded that is not accessible to go to a health facility to acquire a method. However, they are not using any contraceptive method, it is by the side effects.

**Keyword:** Features, family planificacionil, women age fert

## ÍNDICE DE TABLAS

TABLA N.- 1 a	CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS	13
	▪ EDAD	
TABLA N.- 1b	CARACTERÍSTICA SOCIODEMOGRÁFICA	14
	▪ GRADO DE INSTRUCCIÓN	
TABLA N.- 1c	CARACTERÍSTICA SOCIODEMOGRÁFICA	15
	▪ ESTADO CIVIL	
TABLA N.- 1d	CARACTERÍSTICA SOCIODEMOGRÁFICA	16
	▪ OCUPACIÓN	
TABLA N.- 2a	CARACTERÍSTICA GINECO – OBSTÉTRICA	17
	▪ INICIO DE RELACIONES SEXUALES	
TABLA N.- 2b	CARACTERÍSTICA GINECO – OBSTÉTRICA	18
	▪ N° DE PAREJAS SEXUALES	
TABLA N.- 2 c	CARACTERÍSTICA GINECO – OBSTÉTRICA	19
	▪ N° DE HIJOS	
TABLA N.- 3a	ACCESIBILIDAD DE MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	20
	▪ CONOCE ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	

TABLA N.- 3b	ACCESIBILIDAD DE MÈTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	21
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ ES PARA UD ACCESIBLE ACUDIR AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ADQUIRIR UN MÈTODO ANTICONCEPTIVO.</li></ul>	
TABLA N.- 3c	ACCESIBILIDAD DE MÈTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	22
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ EL TIEMPO ES UNA LIMITACIÒN PARA NO ASISITR AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA ADQUIRIR UN MÈTODO</li></ul>	
TABLAN.- 4 a	RECIBIÒ INFORMACIÒN	23
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ USA ACTUALMENTE ALGÙN MÈTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.</li></ul>	
TABLA N.- 4 b	RECIBIÒ INFORMACIÒN	24
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ QUIÈN TE ORIENTO SOBRE LOS MÈTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.</li></ul>	
TABLA N.- 4 c	RECIBIÒ INFORMACIÒN	25
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ PORQUE MOTIVO NO USA NINGÙN MÈTODO ANTICONCEPTIVO.</li></ul>	

## ÍNDICE DE GRÁFICO

GRAFICO N.- 1a	CARACTERÍSTICA SOCIODEMOGRÁFICA	13
	▪ EDAD	
GRAFICO N.- 1b	CARACTERÍSTICA SOCIODEMOGRÁFICA	14
	▪ GRADO DE INSTRUCCIÓN	
GRAFICO N.- 1c	CARACTERÍSTICA SOCIODEMOGRÁFICA	15
	▪ ESTADO CIVIL	
GRAFICO N.- 1d	CARACTERÍSTICA SOCIODEMOGRÁFICA	16
	▪ OCUPACIÓN	
GRAFICO N.- 2a	CARACTERÍSTICA GINECO – OBSTÉTRICA	17
	▪ INICIO DE RELACIONES SEXUALES	
GRAFICO N.- 2b	CARACTERÍSTICA GINECO – OBSTÉTRICA	18
	▪ N° DE PAREJAS SEXUALES	
GRAFICO N.- 2c	CARACTERÍSTICA GINECO – OBSTÉTRICA	19
	▪ N° DE HIJOS	

GRAFICO N.- 3a	ACCESIBILIDAD DE MÈTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	20
	▪ CONOCE ALGÙN MÈTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR QUE BRINDA EL HOSPITAL DE VENTANILLA	
GRAFICO N.- 3b	ACCESIBILIDAD DE MÈTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	21
	▪ ES PARA UD ACCESIBLE ACUDIR AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ADQUIRIR UN MÈTODO ANTICONCEPTIVO.	
GRAFICO N.- 3c	ACCESIBILIDAD DE MÈTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	22
	▪ EL TIEMPO ES UNA LIMITACION PARA NO ASISITR AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA ADQUIRIR UN MÈTODO	
GRAFICO N.- 4a	RECIBIÒ INFORMACIÓN	23
	▪ USA ACTUALMENTE ALGÙN MÈTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.	
GRAFICO N.- 4b	RECIBIÒ INFORMACIÓN	24
	▪ QUIÈN TE ORIENTO SOBRE LOS MÈTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.	
GRAFICO N.- 4 c	RECIBIÒ INFORMACIÓN	25
	▪ PORQUE MOTIVO NO USA NINGÙN MÈTODO ANTICONCEPTIVO.	

## Capítulo I

### INTRODUCCIÓN

La planificación familiar es un programa prioritario, permite alcanzar una vida sexual reproductiva sana y placentera, a través de su contribución a la prevención de embarazos no planeados de alto riesgo, disminución del riesgo de mortalidad perinatal, abortos e infecciones de transmisión sexual. Fomenta la actitud responsable frente a la reproducción, contribuye a mejorar las condiciones de vida<sup>1</sup>, debe estar al alcance de todos quienes deseen ejercerlo. Sin embargo, la realidad es que este derecho no está presente, especialmente en aquellos que viven en condiciones vulnerables.

Más de 220 millones de mujeres en países en vías de desarrollo que no desean embarazarse, carecen de acceso a métodos anticonceptivos eficaces, información y servicios de planificación familiar. 80 millones de mujeres han tenido un embarazo no deseado, 1 de cada 4 ha recurrido al aborto, poniendo en riesgo su vida. La planificación familiar disminuye las tasas de embarazo no deseado, y a su vez, la necesidad de recurrir al aborto inseguro, que representa el 13% de la mortalidad materna mundial<sup>2</sup>.

A nivel mundial 867 millones de mujeres en edad fértil que necesitan métodos de planificación familiar; 645 millones tienen acceso, 222 millones siguen careciendo de acceso<sup>3</sup>.

En América Latina y el Caribe, la proporción de mujeres de 15 a 49 años, casadas o que viven en relación de pareja, con necesidades de planificación familiar insatisfechas es de 10% / 17%. La tasa de prevalencia de métodos anticonceptivos es de 74% / 61%. El uso de anticonceptivos modernos es de 67%<sup>3</sup>.

En Nicaragua la planificación familiar solo es una realidad para la mitad de las mujeres unidas o casadas que están en edad reproductiva. Un 53% no usan ningún método de planificación familiar<sup>4</sup>.

En el Perú, la necesidad insatisfecha de Planificación Familiar habría disminuido de 10.2% (ENDES 2000) a 6.1% (ENDES 2011), debemos tener en cuenta que la mayor demanda se presenta en los quintiles de mayor pobreza (9.9%); zonas de selva (9.7%) el área rural (7.5%), donde los problemas de salud reproductiva, como la morbilidad y mortalidad materna, son mayores.<sup>5</sup>

En el Callao la necesidad insatisfecha de planificación familiar es de 7.9% <sup>6</sup>

## **FORMULACIÓN DEL PROBLEMA**

¿Cuáles son las características de las mujeres en edad fértil con vida sexual activa con baja cobertura de planificación familiar del Hospital de Ventanilla Callao – mayo 2015?

## **OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN**

### **OBJETIVOS GENERAL**

Determinar las características de las mujeres en edad fértil con vida sexual activa con baja cobertura de planificación familiar del Hospital de Ventanilla Callao – Mayo 2015?

### **OBJETIVOS ESPECIFICOS**

- Identificar las características sociodemográficas.
- Identificar las características Gineco – Obstétricas.
- Identificar la accesibilidad de los métodos de planificación familiar.
- Identificar la información que tienen sobre métodos anticonceptivos.



## MATERIAL Y MÉTODO

### 2.1 DISEÑO METODOLÓGICO

El estudio es de tipo descriptivo, de corte transversal y prospectivo.

### 2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA

#### 2.2.1 Población

La población de estudio estuvo constituida por 4507 mujeres en edad fértil con vida sexual activa en el Hospital de Ventanilla Callao – Mayo 2015.

#### 2.2.2 Muestra

La muestra para el estudio estuvo constituida por 96 mujeres en edad fértil

Con vida Sexual activa que cumplieron los criterios de inclusión. Por ser una población finita conocemos el total de población, se utilizó la siguiente

Formula.

$$n = \frac{N \times Z^2 \times P \times q}{d^2 (N-1) + Z^2 \times p \times q}$$

$$n = \frac{4507 \times (1.96)^2 (0.5)(0.5)}{0.0098} = 96$$

$$0.0098 (4507-1) + (1.96)^2 (0.5)(0.5)$$

**DONDE:**

- n = tamaño de la muestra
- N= total de la población
- $Z^2 = 1.96$  ( si la seguridad es del 95% )
- P = proporción esperada (en este caso 50% = -0.5)
- q = 1- p ( en este caso = -0.5)
- d= error aceptado ( en este caso 0.0098)

## **2.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN**

### **2.3.1 Criterios de inclusión**

- Mujeres en edad fértil de 15 a 49
- Mujeres con vida sexual activa
- Mujeres que acepten participar en la investigación.

### **2.3.2 Criterios de exclusión**

- Mujeres que desistan, después de haber aceptado participar en la investigación.

## **2.4 VARIABLE Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES**

### **2.4.1 VARIABLES**

**VARIABLE:** características de las mujeres en edad fértil

VARIABLE	DIMENSIONES	INDICADORES	ESCALA DE MEDICIÓN	INSTRUMENTO
C A R A C T E R Ì S T I C A S	SOCIO DEMOGRÀFICOS	<b>EDAD :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 18 – 19 años</li> <li>• 20 – 34 años</li> <li>• ≥ 35 años</li> </ul>	INTERVALO	ENCUESTA
		<b>ESTADO CIVIL:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soltera</li> <li>• Casada</li> <li>• Conviviente</li> </ul>	NOMINAL	ENCUESTA
		<b>GRADO DE INSTRUCCIÓN:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Primaria</li> <li>• Secundaria Incompleta</li> <li>• Secundaria Completa</li> <li>• Técnico</li> <li>• Universitario</li> </ul>	ORDINAL	ENCUESTA
		<b>OCUPACIÓN:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ama de casa</li> <li>• Estudiante</li> <li>• Trabaja</li> </ul>	NOMINAL	ENCUESTA
		<b>INICIO DE RELACIONES SEXUALES:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ de 15</li> <li>• 16 a 24</li> <li>• 25 a 34</li> <li>• 35 a mas</li> </ul>	INTERVALO	ENCUESTA
	GINECO - OBSTETRICAS	<b>NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 a 2 parejas</li> <li>• 3 a 4 parejas</li> <li>• 5 a más parejas</li> </ul>	INTERVALO	ENCUESTA
		<b>PARIDAD:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nulípara</li> <li>• Primípara</li> <li>• Multípara</li> </ul>	ORDINAL	ENCUESTA

VARIABLE	DIMENSIONES	INDICADORES	ESCALA DE MEDICIÓN	INSTRUMENTO	
C A R A C T E R Ì S T I C A S	ACCESIBILIDAD	<b>CONOCE ALGÙN MÈTODO DE PLANIFICACIÒN FAMILIAR :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• conoce poco</li> <li>• conoce regular</li> <li>• conoce suficiente</li> <li>• conoce mucho</li> </ul>	NOMINAL	ENCUESTA	
		<b>ES PARA UD. ACCESIBLE ACUDIR A UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA ADQUIRIR UN MÈTODO ANTICONCEPTIVO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si</li> <li>• No</li> </ul>	NOMINAL	ENCUESTA	
		<b>EL TIEMPO ES UNA LIMITACION PARA NO ASISTIR AL SERVICIO DE PLANIFICACIÒN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horario inadecuado</li> <li>• Demora en la atención</li> <li>• Demora para obtener las historias clínicas</li> <li>• No es una limitación</li> </ul>	NOMINAL	ENCUESTA	
	RECIBIÒ INFORMACIÒN		<b>SABÈ QUE LA CONSULTA Y LOS MÈTODOS DE PLANIFICACIÒN FAMILIAR SON GRATUITOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si</li> <li>• No</li> </ul>	NOMINAL	ENCUESTA
			<b>USA ACTUALMENTE ALGÙN MÈTODO DE PLANIFICACIÒN FAMILIAR:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No usa ningùn mètodo</li> <li>• Píldoras</li> <li>• Inyectable mensual</li> <li>• Inyectable trimestral</li> <li>• T de cobre</li> </ul>	NOMINAL	ENCUESTA
			<b>QUIEN TE ORIENTO SOBRE LOS MÈTODOS DE PLANIFICACIÒN FAMILIAR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farmacia</li> <li>• Amiga</li> <li>• Enamorado</li> <li>• Madre</li> <li>• Medico</li> <li>• Obstetra</li> <li>• No recibió orientación</li> </ul>	NOMINAL	ENCUESTA
			<b>PORQUE MOTIVO NO USA NINGÙN MÈTODO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Miedo a los efectos secundarios</li> <li>• Su pareja está de viaje</li> <li>• Producen càncer</li> <li>• No lo necesita</li> <li>• Si usa</li> </ul>	NOMINAL	ENCUESTA

## **2.5 TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS, PROCESAMIENTOS.**

Se solicitó el permiso respectivo al Jefe médico del Hospital de Ventanilla del Provincia del Callao y al servicio de Obstetricia, debido al convenio marco que tiene la universidad san Martín de Porres con el Hospital de Ventanilla en mención.

La información se obtuvo mediante encuestas y se recopiló en un instrumento previamente diseñado (anexo).

Se recolectó la información los días de lunes a viernes por las Mañanas.

## **2.6 TECNICA PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN**

Los datos recolectados que cumplieron con los criterios de inclusión fueron Procesados mediante.


- Ordenamiento de datos
- Tabulación de datos
- Presentación de tablas de acuerdo al nivel de medición
- Los datos obtenidos fueron registrados con ayuda del ordenador y programa estadístico SPSS 22.0 para el análisis y la distribución en tablas.

## 2.7 ASPECTOS ÉTICOS

La información se recolectó con la autorización del Jefe de la Unidad de Estadística e Informática y el Jefe del Departamento de Ginecología Y Obstetricia del Hospital de Ventanilla.

Se presentó una carta emitida por las Autoridades de la facultad de obstetricia y enfermería de la Universidad De San Martin De Porres, para realizar la presente investigación con el motivo de obtener el título de licenciada en obstetricia.

Comprometiéndome a guardar La confidencialidad y privacidad de los datos que fueron utilizados sólo para la presente investigación.



# RESULTADOS



**CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL CON VIDA  
SEXUAL ACTIVA CON BAJA COBERTURA DE PLANIFICACIÓN  
FAMILIAR DEL HOSPITAL DE VENTANILLA CALLAO –MAYO 2015**

**Tabla N° 1a**

**CARACTERÍSTICA SOCIODEMOGRÁFICA**


**EDAD**

EDAD	N°	%
18 – 19 años	5	5.2
20 – 34 años	56	58.3
≥ 35 años	35	36.5
<b>TOTAL</b>	<b>96</b>	<b>100</b>

Fuente: Ficha de recolección de datos

Se observa que el (58.3 %) de las mujeres en edad fértil se encontraba conformado por el grupo de 20 a 34 años, la edad media fue de 31.41 años, observándose una edad mínima de 18 años y una edad máxima de 49 años.

**GRÁFICO N° 1a**



**CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL CON VIDA  
SEXUAL ACTIVA CON BAJA COBERTURA DE PLANIFICACIÓN  
FAMILIAR DEL HOSPITAL DE VENTANILLA CALLAO –MAYO 2015**

**TABLA N°1b**

**CARACTERÍSTICA SOCIODEMOGRÁFICA**


**GRADO DE INSTRUCCIÓN**

GRADO DE INSTRUCCIÓN	N°	%
Primaria	7	7.3
Secundaria Incompleta	19	19.8
Secundaria Completa	48	50
Técnico	18	18.8
Universitario	4	4.2
TOTAL	96	100

Fuente: Ficha de recolección de datos

En cuanto al grado de instrucción de las mujeres en edad fértil observamos que el 50% habían concluido el nivel de secundaria completa.

**GRÁFICO N° 1b**



**CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL CON VIDA  
SEXUAL ACTIVA CON BAJA COBERTURA DE PLANIFICACIÓN  
FAMILIAR DEL HOSPITAL DE VENTANILLA CALLAO –MAYO 2015**

**TABLA N°1c**

**CARACTERÍSTICA SOCIODEMOGRÁFICA**

**ESTADO CIVIL**


ESTADO CIVIL	N°	%
Soltera	21	21.9
Casada	24	25
Conviviente	51	53.1
TOTAL	96	100

Fuente:

Ficha de recolección de datos

Quando se indagó sobre el estado civil se constató que el 53.1%  
Convivía con sus parejas.

**GRÁFICO N° 1c**



**CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL CON VIDA  
SEXUAL ACTIVA CON BAJA COBERTURA DE PLANIFICACIÓN  
FAMILIAR DEL HOSPITAL DE VENTANILLA CALLAO –MAYO 2015**

**TABLA N°1d**

**CARACTERÍSTICA SOCIODEMOGRÁFICA**


**OCUPACIÓN**

OCUPACIÓN	N°	%
Ama de casa	53	55.2
Estudiante	8	8.3
Trabaja	35	36.5
TOTAL	96	100

Fuente: Ficha de recolección de datos

Al preguntar a las mujeres en edad fértil sobre la ocupación que tenían en el momento que se le realizó la encuesta, el 55.2% eran ama de casa.

**GRÁFICO N° 1d**



**CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL CON VIDA  
SEXUAL ACTIVA CON BAJA COBERTURA DE PLANIFICACIÓN  
FAMILIAR DEL HOSPITAL DE VENTANILLA CALLAO –MAYO 2015**

**TABLA N°2a**

**CARACTERÍSTICA GINECO – OBSTÉTRICA**


**INICIO DE RELACIONES SEXUALES**

<b>Inicio de relaciones sexuales</b>	<b>N°</b>	<b>%</b>
≤ de 15	23	24
16 a 24	64	66.7
25 a 34	8	8.3
35 a mas	1	1
} total	96	100

Fuente: Ficha de recolección de datos

Se observa que el 66.7% de las mujeres en edad fértil iniciaron sus relaciones sexuales durante 16 a 24 años.

**GRÁFICO N° 2a**



**CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES EN EDAD FÈRTIL CON VIDA  
SEXUAL ACTIVA CON BAJA COBERTURA DE PLANIFICACIÓN  
FAMILIAR DEL HOSPITAL DE VENTANILLA CALLAO –MAYO 2015**

**TABLA N°2 b**

**CARACTERÍSTICA GINECO- OBSTÉTRICA**

**NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES**


<b>Número de parejas sexuales</b>	<b>N°</b>	<b>%</b>
1 a 2 parejas	26	27.1
3 a 4 parejas	45	46.9
5 a más parejas	25	26
<b>Total</b>	<b>96</b>	<b>100</b>

Fuente:

Ficha de recolección de datos

En cuanto al número de parejas sexuales 46.9 % de las entrevistadas indicaron haber tenido de 3 a 4 parejas.

**GRÁFICO N° 2b**



**CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES EN EDAD FÈRTIL CON VIDA  
SEXUAL ACTIVA CON BAJA COBERTURA DE PLANIFICACIÓN  
FAMILIAR DEL HOSPITAL DE VENTANILLA CALLAO –MAYO 2015**

**TABLA N°2c**

**CARACTERÍSTICA GINECO – OBSTÉTRICA**


**PARIDAD**

<b>Paridad</b>	<b>N°</b>	<b>%</b>
Nulípara	14	14.6
Primípara	23	24.0
Múltipara	59	61.5
<b>Total</b>	<b>96</b>	<b>100</b>

Fuente: Ficha de recolección de datos

Se observa que el 61.5% de las mujeres en edad fértil son múltiparas.

**GRÁFICO N°2**



**CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES EN EDAD FÈRTIL CON VIDA  
SEXUAL ACTIVA CON BAJA COBERTURA DE PLANIFICACIÓN  
FAMILIAR DEL HOSPITAL DE VENTANILLA CALLAO –MAYO 2015**

**TABLA N°3 a**


**ACCESIBILIDAD DE LOS MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR  
MÉTODOS QUE BRINDA EL HOSPITAL**

<b>CONOCE ALGÙN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR</b>		
	<b>N°</b>	<b>%</b>
Conoce poco	22	22.9
Conoce regular	25	26
Conoce suficiente	26	27.1
Conoce mucho	23	24
<b>Total</b>	<b>96</b>	<b>100</b>

Fuente: Ficha de recolección de datos

Encontramos que conocen algún método de planificación suficiente  
(27.1%)

**GRÁFICO N° 3a**



**CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES EN EDAD FÈRIL CON VIDA  
SEXUAL ACTIVA CON BAJA COBERTURA DE PLANIFICACIÒN  
FAMILIAR DEL HOSPITAL DE VENTANILLA CALLAO –MAYO 2015**

**TABLA N°3b**

**ACCESIBILIDAD DE LOS MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR**


**ACCESO DE MÉTODOS**

<b>Es para UD. Accesible acudir a un establecimiento de salud para adquirir un método anticonceptivo</b>	<b>N°</b>	<b>%</b>
Si	33	34.4
No	63	65.6
Total	96	100

Fuente: Ficha de recolección de datos

En cuanto a la accesibilidad para acudir al establecimiento de salud para poder adquirir un método anticonceptivo 65.6% indicaron que no es accesible.

**GRÁFICO N°3b**



**CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL CON VIDA  
SEXUAL ACTIVA CON BAJA COBERTURA DE PLANIFICACIÓN  
FAMILIAR DEL HOSPITAL DE VENTANILLA CALLAO –MAYO 2015**

**TABLA N°3 c**

**ACCESIBILIDAD DE MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR**


**SEGÚN: TIEMPO**

<b>El tiempo es una limitación para no asistir al servicio de planificación</b>	<b>N°</b>	<b>%</b>
Horario inadecuado	44	45.8
Demora en la atención	7	7.3
Demora para obtener las historias clínica	4	4.2
No es una limitación	41	42.7
<b>Total</b>	<b>96</b>	<b>100</b>

Fuente: Ficha de recolección de datos

Al preguntar a las mujeres si el tiempo es una de las limitaciones para no asistir al servicio de planificación familiar indicaron 45.8% horario inadecuado.

**GRÁFICO N°3 c**



**CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES EN EDAD FÈRTIL CON VIDA  
SEXUAL ACTIVA CON BAJA COBERTURA DE PLANIFICACIÓN  
FAMILIAR DEL HOSPITAL DE VENTANILLA CALLAO –MAYO 2015**

**TABLA N°4a**


**RECIBIÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  
GRATUIDAD DE METODOS**

<b>SABE QUE LA CONSULTA Y LOS MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR SON GRATUITOS</b>	<b>N°</b>	<b>%</b>
Si	95	99
No	1	1
Total	96	100

Fuente: Ficha de recolección de datos

Se les preguntó a las mujeres en edad fértil si sabían que la consulta y los métodos de planificación familiar son gratuitos, 99.0% indicaron que si saben.

**GRÁFICO N° 4 a**



**CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES EN EDAD FÈRTIL CON VIDA  
SEXUAL ACTIVA CON BAJA COBERTURA DE PLANIFICACIÓN  
FAMILIAR DEL HOSPITAL DE VENTANILLA CALLAO –MAYO 2015**

**TABLA N° 4b**


**RECIBIÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  
USO DE MÉTODOS**

<b>Usa actualmente algún método de planificación</b>	<b>N°</b>	<b>%</b>
No usa ningún método	54	56.3
Píldoras	17	17.7
Inyectable mensual	9	9.4
Inyectable trimestral	14	14.6
T de cobre	2	2.1
<b>Total</b>	<b>96</b>	<b>100</b>

Fuente: Ficha de recolección de datos

Al momento de la entrevista se les preguntó a las mujeres en edad fértil si estaban usando actualmente algún método de planificación familiar 56.3% indicaron no usar ningún método.

**GRÁFICO N° 4b**



**CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES EN EDAD FÈRTIL CON VIDA  
SEXUAL ACTIVA CON BAJA COBERTURA DE PLANIFICACIÓN  
FAMILIAR DEL HOSPITAL DE VENTANILLA CALLAO –MAYO 2015**

**TABLA N° 4c**

**RECIBIÓ INFORMACIÓN SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS**


**SEGÚN: ORIENTACIÓN**

<b>QUIÈN TE ORIENTO SOBRE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS</b>	<b>N°</b>	<b>%</b>
FARMACIA	13	13.5
AMIGA	9	9.4
ENAMORADO	6	6.3
MADRE	5	5.2
MÉDICO	4	4.2
OBSTETRA	44	45.8
NO RECIBIO ORIENTACION	15	15.6
Total	96	100

Fuente: Ficha de recolección de datos

Cuando se les pregunto quièn le orientò sobre sobre los métodos de planificación familiar respondieron que 45.8% fue por la obstetra.

**GRÁFICO N°4c**



**CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES EN EDAD FÈRTIL CON VIDA  
SEXUAL ACTIVA CON BAJA COBERTURA DE PLANIFICACIÓN  
FAMILIAR DEL HOSPITAL DE VENTANILLA CALLAO –MAYO 2015**

**TABLA N° 4 d**

**RECIBIÓ INFORMACIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS**


**SEGÚN: USO**

<b>PORQUÉ MOTIVO NO USA NINGÚN MÉTODO</b>	<b>N°</b>	<b>%</b>
Miedo a los efectos secundarios	38	39.6
Su pareja está de viaje	4	4.2
No lo necesita	17	17.7
Si usa	37	38.5
Total	96	100

Fuente: Ficha de recolección de datos

Al preguntar a las mujeres por qué motivo no usan ningún método anticonceptivo indicaron que por miedo a los efectos secundarios 39.6%.

**GRÁFICO N° 4 d**



**DISCUSIÓN**

El presente estudio se llevó a cabo en el Hospital de Ventanilla provincia constitucional del Callao con el objetivo de determinar las características

de las mujeres en edad fértil con vida sexual activa con baja cobertura de planificación familiar del Hospital de Ventanilla callao - mayo 2015

Se entiende por planificación familiar que es un programa prioritario, permite alcanzar una vida sexual reproductiva sana y placentera, a través de su contribución a la prevención de embarazos no planeados y alto riesgo, disminución del riesgo de mortalidad perinatal, abortos e infecciones de transmisión sexual.<sup>1</sup>

A nivel mundial 867 millones de mujeres en edad fértil que necesitan métodos de planificación familiar; 645 millones tienen acceso ,222 millones siguen careciendo de acceso.<sup>3</sup>

En el callao la necesidad insatisfecha de planificación familiar es de 7.9%.<sup>5</sup>

## **EN LA TABLA N.- 1 EN CUANTO CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS**

**SEGÚN EDAD:** el mayor porcentaje de mujeres en edad fértil con vida sexual activa se encuentra entre las edades de 20 a 34 años (58,3%).se encontró semejanza con **Motta F.** en el 2011 encontró que la edad con mayor significancia de las mujeres en edad fértil fue de 26 a 35 años, de igual manera datos similares fueron encontrados por <sup>6</sup> **RIOS L.** quien obtuvo en el 2012 que la mayor cantidad de mujeres en edad fértil fue de 22 a 35 años (67.8%).<sup>7</sup>

**ORIHUELA T.** encontró en el 2011 que el grupo de edad de 21 a 26 es el más frecuente (26 %)<sup>8</sup>.**Según QUISPE E.** encontró en el 2012 que el 48% de las usuarias tuvieron de 20 a 25 años.<sup>9</sup> **MATTA I.** Encontró en el 2011 que el 63.3% pertenece al grupo de 15 a 34 años.<sup>10</sup> Investigadores como

**MAFLA D, YAMA V,** encontraron en el 2014 que el rango de edad que prevalece en las usuarias ,corresponde a las edades de 20 a 29 años (36.7 %).<sup>11</sup> **Según MENDOZA B.** encontró en el 2014 que la edad que más prevaleció fue de 33 años <sup>12</sup>

**En Cuanto Al Grado De Instrucción,** se obtuvo que el mayor porcentaje se encontraba con un nivel de instrucción de secundaria completa (50,0%). Datos diferentes encontró **MOTTA F.** en el 2011, que culminaron con nivel de instrucción primaria 8.6% las mujeres que acuden al centro de salud y 37.1% las que no acuden .<sup>6</sup> **ORIHUELA T.** encontró en el 2011 que el mayor porcentaje tenían el nivel superior con 35%.<sup>8</sup> datos similares obtuvo **QUISPE E.** en el 2012 que un mayor porcentaje de mujeres culminaron sus estudios secundarios 49.3%.<sup>9</sup> **Según MATTA I.** Encontró en el 2011 que el 75% de las mujeres tenían escolaridad .<sup>10</sup> **AGUDELO M.** Encontró en el 2010 que el 26.1% tenían secundaria completa y de igual manera los de media superior .<sup>13</sup> **Investigadores como MENENDEZ L , y CABRERA J.** obtuvieron en el 2010 que el mayor porcentaje de las mujeres solo habían culminado su primaria completa 30% y primaria Incompleta 30%.<sup>14</sup> **Por ultimo MENDOZA B.** encontró en el 2014 que las mujeres que contaban con estudios secundarios 29% datos semejantes al presente estudio <sup>12</sup>.

**Con Respecto Al Estado Civil ,**se observó que las mujeres en edad fértil conviven 53,1% datos similares encontró **MOTTA F.** quien Observó en el 2011, que la mayoría de las mujeres entre las que acuden al centro de salud 50% y las que no acuden 51.4% conviven.<sup>6</sup> con iguales resultados a la investigación **ORIHUELA T.** quien mostró en el 2011 que La mayoría de

las usuarias que acuden al consultorio de planificación familiar fueron convivientes en un 42%.<sup>8</sup> Asimismo **MATTA I.** Encontró en el 2011 que el 62.8% de las mujeres eran casadas y solo 37.2% eran convivientes.<sup>10</sup> Investigación hecha por **AGUDELO M.** Encontró en el 2010 que el 75.7 % estaban unidas y el 15.2% no estaban unidas.<sup>13</sup> resultados similares al presente estudio encontraron **MAFLA D, y YAMA V.** quienes obtuvieron en el 2014 que la mayoría de las mujeres encuestadas correspondieron al vínculo de unión libre 54.6%.<sup>11</sup>

**En Cuanto A La Ocupación,** se encontró que la mayoría de las mujeres son ama de casa 55,2%. **MOTTA F.** encontró en el 2011 que el mayor porcentaje eran las amas de casa 60.1% las que no asisten al servicio de planificación familiar y 50.7% las que acuden, porcentajes iguales al presente estudio, <sup>6</sup> iguales resultados encontró **MATTA I.** en el 2011, que la mayoría tenían ocupación ama de casa 46%.<sup>10</sup> **MENDOZA B.** en el 2014 el mayor porcentaje, fueron de amas de casas 78.2% resultados similares al presente estudio <sup>12</sup>.

**EN LA TABLA N.-2 .EN CUANTO A LAS CARACTERÍSTICAS GINECO – OBSTÉTRICAS,** se observó el mayor porcentaje en mujeres que iniciaron su vida sexual entre las edades de 16 a 24 años 66.7%.

**EN RELACIÓN AL NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES,** se encontró que las mujeres en edad fértil con vida sexual activa tuvieron de 3 a 4 parejas 46,9%.

**EN RELACIÓN CON LA PARIDAD**, se encontró que el mayor porcentaje fueron multiparas 61,5%. **MOTTA F.** obtuvo en el 2011 que el 75% tuvieron de 1 a 2 hijos las que acuden al centro de salud y las que no acuden 65.7%.<sup>6</sup> **MATTA I.** en el 2011 encontró que el mayor porcentaje fueron mujeres que tuvieron de 0 a 3 hijos 52.2%.<sup>10</sup> **ORIHUELA T.** Indicó que Las usuarias manifestaron tener dos hijos 35%.<sup>8</sup> otros investigadores como **MAFLA D, YAMA V.** encontraron en el 2014 que la mayoría de las mujeres tuvieron de 1 a 2 hijos (47.7%).<sup>11</sup>

**EN LA TABLA N.-3 EN CUANTO A LA ACCESIBILIDAD DE LOS MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN**, se encontró que las mujeres en edad fértil con vida sexual activa conocen suficiente sobre métodos de planificación familiar 27,1%, datos diferentes encontró **ORIHUELA T.** En el 2011 donde las mujeres conocen suficiente sobre los métodos anticonceptivos 42.7% y conocen insuficiente 57.3%,<sup>8</sup> datos distintos al presente estudio obtuvieron **MAFLA D, YAMA V.** en el 2014 donde la Mayoría de las mujeres en edad fértil no conocían los métodos de planificación familiar que brindaba su hospital 65.6%.<sup>11</sup>

**EN CUANTO SI ES ACCESIBLE ACUDIR AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA ADQUIRIR UN MÉTODO ANTICONCEPTIVO**, Se observó el mayor porcentaje de las mujeres en edad fértil con vida sexual activa respondieron que no es accesible 65,6% .datos similares observó **MATTA I.** En el 2011 que el mayor porcentaje de las mujeres indicaron que no es accesible 70.9%.<sup>10</sup> otros investigadores como **MENENDEZ L, CABRERA J.** Mostraron en el 2010 que el mayor porcentaje de las mujeres en edad fértil

indicaron que no tenían dificultad para asistir al servicio de planificación familiar para obtener métodos anticonceptivos<sup>14</sup>.

**EN CUANTO AL TIEMPO ES UNA DE LAS LIMITACIONES PARA NO ASISTIR AL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR**, el mayor porcentaje índice no asistir por el horario inadecuado 45,8%. A diferencia de **RIOS L.** En el 2012 encontró que el mayor porcentaje de las mujeres indicaron el tiempo de espera (74.7%).<sup>7</sup> **MATTA I.** En el 2011 encontró que el mayor porcentaje de mujeres manifestaron que el tiempo de espera 72.5%.<sup>10</sup>

**En la TABLA N.- 4. RECIBÍ INFORMACIÓN SOBRE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS**, se observó que el mayor porcentaje de las mujeres indicaron saber que la consulta y los métodos de planificación familiar es gratuito 99,0%. **MATTA I.** en el 2011 manifestó que el mayor porcentaje de las mujeres en edad fértil 65.7%. Indicaron saber que la consulta y los métodos son gratuitos. <sup>10</sup>

**EN CUANTO AL USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS**, se observó que el mayor porcentaje de las mujeres en edad fértil indicaron no usar

Ningún método Anticonceptivo 56,3%. datos diferentes encontró **MOTTA F.** Mostró en el 2011 que el mayor porcentaje de las mujeres usan los inyectables trimestrales (56.4 %).<sup>6</sup> datos similares encontraron **MAFLA D, YAMA V.** En el 2014, que La mayoría de mujeres en edad fértil no utilizan métodos de planificación familiar 83%.<sup>11</sup> datos diferentes al presente estudio Encontraron **MENENDEZ L, CABRERA J.** en el 2010 que el 100% de las mujeres si utilizan métodos anticonceptivos lo cual indica la importancia de usar métodos anticonceptivos, los beneficios que conlleva a la mujer y

otros aspectos para bien de la familia.<sup>14</sup> Datos similares encontró **SANDOVAL A.** En el 2012 el mayor porcentaje que prevaleció fue 54% de las mujeres que no utiliza ningún método .<sup>15</sup> **MENDOZA B.** mostró en el 2014 que el 43% de las mujeres no utilizan ningún método .<sup>12</sup>

**EN CUANTO QUIEN LE ORIENTO SOBRE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS,** el mayor porcentaje de las mujeres indicaron que fueron orientadas por la obstetra 45,8%.investigadores como **MAFLA D,** **YAMA V.** en el 2014 encontró que el mayor porcentaje de las mujeres fueron asesoradas por la obstetra 57.3%. <sup>11</sup>

**EN RELACIÓN PORQUÉ MOTIVO NO USA NINGÚN MÉTODO ANTICONCEPTIVO,** el mayor porcentaje de no usar ningún método fue por miedo a los efectos secundarios 39,6%, datos diferentes al estudio encontró **MOTTA F.** En el 2011 que las mujeres en edad fértil no usan ningún método porque están solteras (22.1%).<sup>6</sup>

## CONCLUSIONES

- ❖ Las características de las mujeres en edad fértil con vida sexual activa estuvo conformado entre las edades: 20 a 34 años, habían concluido el nivel secundaria completa, la mayoría eran convivientes y ama de casa.
- ❖ Según las características Gineco - obstétricas de las mujeres en edad fértil iniciaron sus relaciones sexuales durante la adolescencia, indicaron también haber tenido de 3 a 4 parejas sexuales y la mayoría de ellas fueron multíparas.
- ❖ El horario inadecuado es una de las limitaciones para que las mujeres no asistan al servicio de planificación, en su mayoría respondieron que no es accesible acudir a un establecimiento de salud para adquirir un método. sin embargo no están usando ningún método anticonceptivo, por los efectos secundarios, podemos ver que un gran porcentaje de mujeres en edad fértil no previene un embarazo no planificado, ni las infecciones de transmisión sexual, el VIH/SIDA.
- ❖ La mayoría de las mujeres manifestaron saber que la consulta y los métodos son gratuitos, indicaron conocer suficiente de los métodos de planificación familiar y en su mayoría fueron orientadas por la obstetra.

## RECOMENDACIONES

- ❖ Generar estrategias para incentivar a las mujeres en edad fértil acudan al servicio de planificación familiar independientemente de la causa por la que acuden al hospital de ventanilla.
- ❖ Organizar y realizar charlas de planificación familiar periódicamente otorgando información adecuada a las mujeres en edad fértil que llegan al hospital de ventanilla sobre la importancia y beneficios de los métodos anticonceptivos.
- ❖ Ampliar el horario de atención del servicio de planificación familiar

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1.- Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo Internacional Usaid segmentación del mercado de servicio de planificación familiar en Guatemala 1.16 - .2009 (Consultado – 1/03/15)
- 2.- Planificación familiar: United Nations Población Fund.  
<http://lac.unfpa.or/temas/planificaci%c3%b3n-familiar> (Consultado - 1/03/15)
- 3.- Granados G. Planificación en el Mundo, ONU toda la información Sobre Naciones Unidas Colombia 2014. (Consultado – 3/03/15)
- 4.- Morales I, Orozco d, Sequeira y. Uso de métodos anticonceptivos en usuarias del servicio de Gineco obstetricia Hospital Regional Asunción I trimestre; universidad Nacional Autónoma de Nicaragua enero-abril 2010 (consultado – 6/3/15).
- 5.- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Perú. Encuesta Demográfica y de Salud familiar 2011 Nacional y Departamental. Lima inei 2012. (Consultado – 6/ 3/15).

- 6.- Motta F. Influencia de la planificación familiar en mujeres en edad fértil que acuden al Centro de Salud Carmen de la Legua Callao Mayo a junio 2011. (Consultado – 7/3/15).
- 7.- Ríos I. Percepción de la calidad de la atención en el programa de planificación familiar del Hospital Nacional Arzobispo Loayza: perspectiva de los usuarios lima –febrero 2012. (Consultado – 18/3/15).
- 8.- Orihuela T. Evaluación de la calidad de atención del servicio de planificación familiar del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión - Callao febrero 2011(consultado – 18/3/15).
- 9.- Quispe E. Efectos colaterales de los métodos anticonceptivos más utilizados en las usuarias del servicio de planificación familiar del Centro de Salud infantas – los olivos 2012. (Consultado 20/ 3/15).
- 10.- Matta I. Factores asociados a la baja cobertura de planificación familiar en mujeres indígenas, en edad fértil, con vida sexual activa, de San Lorenzo, Amealco Universidad Autónoma de Querétaro junio 2011. (Consultado- 20/3/15).

- 11.- Mafla D, yama V. Factores sociales, culturales y religiosos que impiden la utilización de métodos anticonceptivos en mujeres en edad fértil en el servicio de ginecología del Hospital Marco Vinicio Iza de la provincia de sucumbios en el periodo marzo – agosto 2014. (Consultado- 1/4/15)
- 12.- Mendoza B. Factores que intervienen en el uso de métodos anticonceptivos en usuarias de una unidad de primer nivel mayo 2014 México.(consultado - 1/4/15)
- 13.- Agudelo M. Caracterización de barreras en planificación familiar en contextos marginales del distrito federal visión de los prestadores de servicio de salud - 2010.(consultado -20/3/15)
- 14.- Menéndez I, Cabrera J. Factores que influyen en la aceptación o rechazo de métodos anticonceptivos en las mujeres en edad reproductiva de la comunidad de nuevo Horizonte Santa Ana, peten Guatemala – julio 2010. (Consultado- 22/3/15).
- 15.- Sandoval A. Necesidad insatisfecha de planificación familiar en mujeres en edad fértil Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 2012. (Consultado- 26/3/15).

**UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES**  
**FACULTAD DE OBSTETRICIA Y ENFERMERIA**

**Escuela de obstetricia**

**Título: características de las mujeres en edad fértil con vida sexual activa con baja cobertura de planificación familiar del Hospital de Ventanilla Callao- Mayo 2015**

**1) CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS**

**1.1.- edad**

- a) 18 a 19 años      b) 20 a 34 años      c)  $\geq$  35 años

**1.2.- estado civil**

- a) Soltera                      b) casada                      c) conviviente

**1.3.- Grado de instrucción**

- a) Primeria      b) secundaria incompleta      c) secundaria completa  
d) técnico      d) universitario

**1.4.- ocupación**

- a) Ama de casa              b) estudiante              c) trabajan

**2) CARACTERISTICAS GINECO - OBSTETRICAS**

**2.1.- Inicio de relaciones sexuales**

- a)  $\leq$  de 15  
b) 16 a 24  
c) 25 a 34  
d)  $>$  35 a mas

**2.2.- Número de parejas sexuales**

- a) 1 a 2 parejas              b) 3 a 4 parejas              c) 5 a mas parejas

**2.3.- paridad**

- b) Nulípara                      b) primípara                      c) multípara

### **3) ACCESIBILIDAD DE MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN**

**3.1.- conoce algún método de planificación familiar que brinda el Hospital De Ventanilla**

- a) conoce poco
- b) conoce regular
- c) conoce suficiente
- d) conoce mucho

**3.2.- Es para Ud. accesible acudir a un establecimiento de salud para Adquirir un MAC**

- a) SI
- b) NO

**3.3.- El tiempo es una de las limitaciones que tiene para no asistir al Servicio de planificación familiar**

- a) Horario inadecuado
- b) Demora en la atención
- c) Demora para obtener las historias clínicas
- d) No es una limitación

**4) RECIBIÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.**

**4.1.- Sabe que la consulta y el método de planificación familiar en los establecimientos es gratuito**

- a) Si
- b) no

**4.2.- Usa actualmente algún método anticonceptivo**

- a) No usa ningún método
- b) Píldoras
- c) Inyectable mensual
- d) Inyectable trimestral
- e) T de cobre

**4.3.- Quién te orientó sobre los métodos de planificación familiar**

- a) Farmacia
- b) Amiga
- c) Enamorado
- d) Madre
- e) Medico
- f) Obstetra
- g) No recibió orientación

**4.4.- Por qué motivo no usa ningún método de planificación familiar**

- a) Miedo a los efectos secundarios
- b) Su pareja está de viaje
- c) Producen cáncer
- d) No lo necesita

