



FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

**EFFECTO HIPOGLICEMIANTE DEL EXTRACTO ACUOSO DE
MORINGA OLEIFERA "MORINGA" COMPARADO CON
SMALLANTHUS SONCHIFOLIUS "YACÓN" EN RATTUS
NORVEGICUS VAR. ALBINA CON DIABETES MELLITUS INDUCIDA**

TESIS

PARA OPTAR

EL TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO CIRUJANO

PRESENTADA POR

**DINA MARGARITA SEGURA MUÑOZ
OTTO WISLAN VARGAS TINEO**

ASESOR

DRA. LIZZIE KAREN BECERRA GUTIERREZ

CHICLAYO, PERÚ

2021



**Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada
CC BY-NC-ND**

El autor sólo permite que se pueda descargar esta obra y compartirla con otras personas, siempre que se reconozca su autoría, pero no se puede cambiar de ninguna manera ni se puede utilizar comercialmente.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTIN DE PORRES

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

PREGRADO

EFFECTO HIPOGLICEMIANTE DEL EXTRACTO ACUOSO DE *MORINGA OLEIFERA* "MORINGA" COMPARADO CON *SMALLANTHUS SONCHIFOLIUS* "YACÓN" EN *RATTUS NORVEGICUS VAR. ALBINA* CON DIABETES MELLITUS INDUCIDA

TESIS

**PARA OPTAR EL TÍTULO DE
MÉDICO CIRUJANO**

PRESENTADO POR

DINA MARGARITA SEGURA MUÑOZ

OTTO WISLAN VARGAS TINEO

ASESORA

DRA. LIZZIE KAREN BECERRA GUTIERREZ

**CHICLAYO, PERÚ
2021**

JURADO

JUAN ALBERTO LEGUIA CERNA
Presidente del Jurado Calificador

HERRY LLOCLLA GONZALES
Miembro del Jurado Calificador

RAUL FERNANDO ORTIZ REGIS
Miembro del Jurado Calificador

DEDICATORIA

A Dios, verdadera fuente de amor, inspiración y sabiduría.

A mis padres Manuel y Elbia, que siempre me enseñan a nunca darme por vencida y que todas nuestras metas siempre son posibles puestas en las manos de Dios, por su apoyo incondicional y la confianza puesta en mí para poder culminar esta hermosa carrera de servicio. A mis hermanas Ana, Cecilia, Rut, por su cariño y motivación, a mis sobrinos Carlitos y Mathyas por sus pequeños detalles que alegraban mis días.

DINA

A mis amados padres Otto y Mery, por su amor y motivación para continuar esta hermosa carrera de servicio al darme su apoyo absoluto, son fuente de inspiración y lucha constante, a mi hermana Luz por su cariño, motivación y cuidado desde pequeño, además de brindarme su apoyo a cada momento; a mis tíos, primos, sobrinos y amigos por su aprecio y palabras de aliento.

OTTO

A nuestra asesora, Dra. Lizzie, ya que parte del desarrollo de este trabajo lo debemos gracias a su guía, ayuda, aliento a continuar y no darnos por vencidos.

AGRADECIMIENTOS

A Dios, porque tenemos la certeza que sin su dirección y ayuda no hubiese sido posible la inspiración, realización y culminación de este trabajo, nos dirigió a las personas indicadas para lograrlo; y a nuestros padres por su apoyo y recursos necesarios para la realización de esta investigación.

Al Dr. Hugo Urbina Ramírez, por compartir sus conocimientos y consejos.

A la Dra. Doyle Benel Fernández, por compartir sus conocimientos y experiencia en investigación, su apoyo en la obtención de materiales necesarios y colaboración en el secado de las hojas de yacón y moringa; y Dr. César Estela Campos, por la identificación de las muestras vegetales para el estudio.

Al Dr. Julio Campos Florián, por compartir sus conocimientos y experiencia en investigación; a las estudiantes de farmacia de la UNT, Katherine Gutiérrez Valderrama por su apoyo en el manejo de los especímenes e Isabel Galliani Huamanchumo por compartir su conocimiento y experiencia para esta investigación. A los esposos Cabrera (Marcela e Irder), y Sr. Andrés Tineo por la colaboración para obtener las hojas de moringa y yacón respectivamente.

Al Dr. Eyner Quenema, por la colaboración y facilidades para el uso del Bioterio del Hospital Regional Lambayeque; y Sra. Elsa Arnao, por la colaboración en el cuidado de los especímenes de experimentación.

A nuestros amigos Sinoe Lozano Becerra y Juan Daniel Adanaqué Guerrero, por su apoyo incondicional para la obtención de insumos necesarios y molienda de hojas de yacón y moringa.

A nuestros asesores, Dra. Lizzie Becerra Gutiérrez, Dr. José Amado Tineo y Dr. Heber Silva Díaz, por su paciencia y dedicación, apoyándonos incondicionalmente en todas las fases de esta investigación.

ÍNDICE

	Págs.
Portada	i
Jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimientos	iv
Resumen	vi
Abstract	vii
INTRODUCCIÓN	1
I. MATERIALES Y METODOS	4
II. RESULTADOS	10
III. DISCUSIÓN	13
IV. CONCLUSIONES	16
V. RECOMENDACIONES	17
FUENTES DE INFORMACIÓN	18
ANEXOS	

RESUMEN

Objetivo: Comparar el efecto hipoglicemiante del extracto acuoso de *Moringa oleífera* (moringa) con *Smallanthus sonchifolius* (yacón) en *Rattus norvegicus*, variedad albina, con diabetes mellitus inducida. **Materiales y métodos:** Estudio preclínico, experimental controlado y aleatorizado. La diabetes se indujo por vía intraperitoneal con una dosis de aloxano a 130 mg/kg de peso vivo (PV); se emplearon 24 *Rattus norvegicus*, variedad albina, machos, cepa Holzman (seis por grupo). Se dividieron de la siguiente manera: grupo control (sin tratamiento), grupo metformina (14 mg/kg PV), grupo *M. oleífera* (200 mg/kg PV), y grupo *S. sonchifolius* (140 mg/kg PV), los tratamientos fueron administrados mediante sonda orogástrica durante 15 días. Los niveles de glicemia fueron determinados usando un glucómetro electrónico Accu-Chek® Instant (Roche). **Resultados:** Se observó reducción de la glicemia en los tratamientos: *M. oleífera* ($p = 0,009$), *S. sonchifolius* ($p = 0,002$) y metformina ($p = 0,002$), en 313 mg/dL, 281,5 mg/dL y 415 mg/dL, respectivamente. En cuanto a la comparación de la glicemia en los grupos tratados y control, se observó que a las 24 horas y cuarto día de tratamiento no hubo diferencia ($p > 0,05$); mientras que al octavo ($p < 0,05$) y décimo quinto día ($p < 0,01$) los grupos tratados tuvieron menor glicemia respecto al control, pero similares entre ellos. **Conclusión:** El extracto acuoso de *S. sonchifolius* y de *M. oleífera* presentaron similar efecto hipoglicemiante en ratas de experimentación con diabetes inducida.

Palabras Clave: Hipoglicemiante; Diabetes Mellitus; *Moringa oleífera*; Ratas; Aloxano.

(Fuente: DeCS BIREME)

ABSTRACT

Objective: To compare the hypoglycemic effect of the aqueous extract of *Moringa oleifera* (moringa) with *Smallanthus sonchifolius* (yacon) on *Rattus norvegicus*, albino variety, with induced diabetes mellitus. **Materials and methods:** Preclinical, experimental, controlled and randomized study. Diabetes was induced intraperitoneally with a dose of alloxan at 130 mg/kg. A total of 24 male *Rattus norvegicus*, albino variety, Holzman strain (6 per group) were used. They were divided as follows: control group (no treatment), metformin group (14 mg/kg), *M. oleifera* group (200 mg/kg), and *S. sonchifolius* group (140 mg/kg), treatments were administered via orogastric tube for 15 days. Glycemia levels were determined using an Accu-Chek® Instant electronic glycometer (Roche). **Results:** Decreased glycemia was observed in the treatment groups: *M. oleifera* ($p = 0.009$), *S. sonchifolius* ($p = 0.002$) and metformin ($p = 0.002$), by 313 mg/dL, 281.5 mg/dL and 415 mg/dL, respectively. When comparing glycemia in the treated and control groups, no difference was observed ($P > 0.05$) at 24 hours and four days of treatment; while at the eighth ($P < 0.05$) and fifteenth day ($P < 0.01$) the treated groups had lower glycemia than the control group, but it was similar among them. **Conclusion:** The aqueous extract of *S. sonchifolius* and *M. oleifera* presented similar hypoglycemic effect in experimental rats with induced diabetes.

Keywords: Hypoglycemic Agents; Diabetes Mellitus; *Moringa oleifera*; Rats; Alloxan
(Source: MeSH NLM).

I. INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud sostiene que el número de personas con diabetes mellitus (DM) en el mundo ha aumentado de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014 y que será la séptima causa de defunción para 2030 (1,2). La diabetes mellitus tipo 2 (DM 2) es un problema en crecimiento, 371 millones de adultos viven con este tipo de diabetes en el mundo, 26 millones (7%) residen en Latinoamérica (3). El Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú (INEI) informó que a nivel nacional el 3,9% de la población de 15 a más años fue diagnosticada con DM en 2019 (4). En la Costa de Perú se reportó mayor población con diabetes (4%) y mayor incidencia en la zona urbana (5).

La DM es una enfermedad crónica degenerativa, sus complicaciones crónicas más frecuentes son nefropatía, neuropatía, retinopatía, cetoacidosis, y enfermedad cardiovascular (6). El tratamiento de la DM 2 es multifactorial y personalizado, teniendo como pilares la nutrición, la actividad física y medicamentos con reportes de adherencia del 47,8% (7). Las guías internacionales recomiendan como primera línea de tratamiento farmacológico a la metformina (8).

Las plantas medicinales (PM) constituyen una alternativa terapéutica viable debido a su bajo precio y fácil disponibilidad para muchas poblaciones, más de 400 PM con gran diversidad fitoquímica son estudiadas por su potencial antidiabético y menor o ningún efecto secundario por lo que es muy importante validar científicamente la efectividad y seguridad para garantizar su uso (9-13). La *Moringa oleífera* (moringa) y *Smallanthus sonchifolius* (yacón) son PM de fácil acceso y bajo costo en nuestro medio.

La *M. oleífera* es un árbol originario del sur del Himalaya (14) forma parte de la familia *Moringaceae* (15). Las hojas de *M. oleífera*, además de proteínas, minerales y vitaminas, contiene los siguientes principios fitoquímicos: flavonoides, ácidos fenólicos, alcaloides y carotenoides, isotiocianatos, glucosinolatos y taninos, saponinas, oxalatos y fitatos (13). Se han identificado posibles compuestos con efecto hipoglicemiante y antioxidante en estudios fitoquímicos previos (6), que actúan por diferentes mecanismos en los que incluyen la inhibición de las actividades de α -amilasa y α -glucosidasa, aumento de la captación de glucosa en los músculos y el hígado, inhibición de la captación de glucosa desde el intestino, disminución de la gluconeogénesis en el hígado y aumento de la secreción y sensibilidad a la insulina (13). Asimismo, estudios revisados de toxicidad en animales de experimentación, han mostrado que los extractos acuosos y alcohólicos de *M. oleífera* no han mostrado efectos adversos (13). Además, la *M. oleífera* protege los tejidos del estrés oxidativo (16), reduce la actividad de los radicales libres, la peroxidación lipídica y previene el desarrollo de complicaciones crónicas (6). El *S. sonchifolius* pertenece a la familia *Asteraceae*, originario de los valles andinos de América del Sur; se cultiva a altitudes de 2000 a 3100 m s.n.m. y alcanza la madurez entre 6 y 12 meses después de la siembra (17). La composición fitoquímica de *S. sonchifolius* ha sido descrita previamente, revelando altas concentraciones de grasas y aceites, fenoles y taninos, alcaloides, lactonas, flavonoides y antocianidinas (12); asimismo, se ha reportado su alta seguridad en pruebas de toxicidad aguda en modelos experimentales, tanto de sus extractos atomizados como de sus alcaloides (12). El *S. sonchifolius* tiene efectos hipoglicemiantes, induce la liberación de insulina y aumenta su concentración en el plasma en ratas diabéticas y normales (18). Este efecto ha sido confirmado

principalmente por el ácido cafeico y clorogénico junto con tres ácidos dicaffeoilquinicos isoméricos, que podrían contribuir satisfactoriamente a una inhibición de la α -glucosidasa en el borde en cepillo de las células del intestino delgado. La decocción de hojas de yacón mostró *in vitro* e *in vivo* alargar el tiempo de absorción de la glucosa, retrasando la digestión rápida de la sacarosa; un componente aislado del yacón, la lactona sesquiterpénica disminuye significativamente los niveles de glicemia posprandial en ratas diabéticas (19).

Se ha demostrado el efecto hipoglucemiante *in vitro* de estas PM (12, 13, 18, 19); sin embargo, se desconoce cuál de las dos plantas tiene mayor efecto *in vivo*, lo que permitiría considerarlas como una alternativa de tratamiento en DM, después de los posteriores y correspondientes ensayos clínicos. El objetivo del presente estudio fue comparar el efecto hipoglicemiante del extracto acuoso de *M. oleífera* y *S. sonchifolius* en *R. norvegicus* con diabetes mellitus inducida.

II. MATERIALES Y METODOS

Diseño experimental

Estudio cuantitativo preclínico, experimental: controlado y aleatorizado.

Criterios de selección

Los criterios de inclusión fueron que sean ratas albinas (*Rattus norvegicus var. albina*) cepa Holzman machos, que desarrollaron diabetes mellitus inducida con aloxano, y se excluyeron todas aquellas ratas albinas que no elevaron sus niveles de glucosa (como mínimo 250 mg/dL) y que presentaron alguna patología.

Animales

Se seleccionaron 24 machos de la cepa Holzman, de entre 12 a 14 semanas de edad aproximadamente y con un peso de 180 ± 20 gramos. Los animales fueron adquiridos en el bioterio del Hospital Regional Lambayeque (HRL), donde tuvieron 10 días de adaptación con comida balanceada procedente de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). La dieta recibida fue de crecimiento con el siguiente valor nutricional: agua 10 %, proteínas 13 % -14 %, Lípidos 3 % - 4% y Calcio 0,5 %; y según la hoja del fabricante, fue elaborado con los siguientes ingredientes: maíz amarillo, torta de soya 48, pasta de algodón, torta de girasol, subproductos de agroindustria, heno de alfalfa, carbonato de calcio, fosfato dicálcico, aminoácidos sintéticos, promotores orgánicos, vitaminas, minerales, cloruro de sodio, antifúngico, antioxidantes.

Recolección y secado de materiales vegetales

Las hojas de moringa se recolectaron del caserío Yurimaguas, distrito de Jayanca de la provincia de Lambayeque, de aproximadamente dos meses de sembrado. Las hojas de yacón se recolectaron en el caserío Montegrande Bajo, distrito de

Huarmaca en la provincia de Huancabamba, Piura, de aproximadamente siete meses de sembrado. Las muestras fueron depositadas en el Herbario Lambayeque PRG, del departamento de Botánica de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) e identificadas por un especialista calificado. Las hojas de moringa y yacón fueron lavadas y puestas en un secador de bandeja con aire caliente durante dos horas a 56 °C, se separaron tallos de hojas, para luego triturar solo hojas con ayuda de un mortero (cada planta por separado). Los triturados de cada planta fueron almacenados en recipientes herméticos por separado, aislados de luz y humedad.

Preparación de tratamientos

Preparación del extracto acuoso de *M. oleifera* y *S. sonchifolius* a 100 mg/ml

En el Laboratorio de Investigación del HRL se pesó 10 g de moringa y de yacón con la ayuda de una balanza analítica; posteriormente, en una cabina de bioseguridad, se mezclaron con 100 mL de agua destilada estéril, se colocaron en tubos estériles de 15 mL, luego llevados a baño maría por treinta minutos a 90 °C. Posteriormente, se centrifugó a 3500 RPM durante diez minutos. En la cabina de bioseguridad, se extrajo el sobrenadante con ayuda de una jeringa estéril de 10 mL que constituyó el extracto acuoso. Se prepararon alícuotas y se conservaron entre 2 y 8 °C hasta su uso en los siguientes próximos cuatro días.

Preparación de metformina a 10 mg/ml

En el Laboratorio de Investigación se pesó 1 g de metformina (Sigma, USA) y se diluyó en 100 mL de agua destilada (20), se homogenizó y conservó a 2-8 °C hasta su uso en los siguientes próximos cuatro días.

Inducción de diabetes mellitus en *Rattus norvegicus* var. *albina* cepa Holfzman

Se les indujo diabetes experimental con una única dosis de aloxano (Sigma, St. Louis, MI, USA), a dosis de 130 mg/kg de peso vivo (PV) vía intraperitoneal. Los niveles de glicemia se midieron a las 72 horas (21) y se consideraron diabéticas aquellas que tengan un nivel de glicemia mayor de 250 mg/dL (22).

Distribución de grupos de estudio

A las ratas diabéticas se las distribuyó en cuatro grupos de seis ratas cada uno. Se enumeró cada rata con un marcador indeleble y se asignaron aleatoriamente con el programa Epidat 4.1. Estos fueron los grupos: grupo control, el cual no recibió tratamiento, y bebió agua a voluntad; grupo metformina, que recibió 14 mg/kg PV, tratamiento estándar de DM 2 (20); grupo *M. oleifera*, que recibió 200 mg/Kg PV de extracto acuoso de *M. oleifera* (16); y grupo *S. sonchifolius*, que recibió 140 mg/Kg PV de extracto acuoso de *S. sonchifolius* (19).

La evaluación y duración del experimento se llevó a cabo durante 15 días consecutivos. Se realizó la medición de los niveles de glicemia a las siete horas. Así mismo las sustancias con efecto hipoglicemiante fueron administradas a las ocho horas, mediante una sonda orogástrica descartable (vía orogástrica), salvo en el grupo control que no recibió tratamiento.

Alimentación

A todos los animales de experimentación se les dio una ración de 14 g de alimento balanceado para roedores una vez al día posterior al tratamiento correspondiente. El día anterior a la toma de glicemia se mantuvo la comida en sus jaulas desde las

diez hasta las diecinueve horas, luego se retiró para el ayuno de 12 horas con agua *ad libitum*.

Medición de la glicemia en ratas

La concentración de glucosa en sangre se midió con el glucómetro Accu-Chek Instant (Roche). El nivel de glicemia durante el experimento fue monitoreado al primer, cuarto, octavo y décimo quinto día postratamiento. Para realizar este procedimiento, los especímenes permanecieron en ayunas 12 horas aproximadamente, se recolectó la muestra de sangre por punción en el ápice de las colas, previa antisepsia del área con alcohol al 70%, desechando la primera gota y recibiendo la siguiente sobre la tira reactiva. Los valores obtenidos se expresaron en mg/dL (ver Anexo 2).

Prueba piloto

Para el presente trabajo se realizó una prueba piloto con el fin de identificar problemas logísticos con los métodos propuestos; determinar recursos necesarios para el estudio; entrenamiento en la crianza, alimentación y manipulación de los animales de experimentación, toma y transporte de muestras (plantas, reactivos y especímenes biológicos) y colocación de sondas orogástricas; estandarizar dosis, tiempo, preparación del reactivo y de los extractos tanto de moringa y de yacón. Se emplearon dos ratas por cada grupo de estudio simulando todo el experimento durante 15 días con la metodología antes descrita.

Validez y confiabilidad de los instrumentos.

Según el reporte del fabricante, el sistema Accu-Chek® Instant (medidor y tiras) se calibra en fábrica a partir de sangre capilar de personas diabéticas (comparación de métodos y exactitud), sangre venosa (repetibilidad) y solución de control (reproducibilidad). Asimismo, al inicio y a la mitad de las mediciones en las ratas,

se realizaron mediciones con la solución control administrada por el fabricante, que contenía una concentración de glucosa de 100 mg/dL.

El equipo cumple con los requerimientos establecidos por las normas ISO 15197:2013 e ISO 15197:2015 para sistemas de ensayo para diagnóstico in vitro, requisitos de los sistemas de autodiagnóstico de monitoreo de glucosa en sangre en el manejo de la DM (23).

Procesamiento y análisis de datos

Los datos se codificaron y digitaron en Microsoft Excel 2016 y se procesaron con IBM SPSS 24 (IBM Corp., Armonk, N.Y., EUA). Luego del análisis de la curva de distribución y el resultado de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilks, se realizó un análisis descriptivo de la glicemia en todos los tratamientos y mediciones, mediante el cálculo de medianas y rangos intercuartílicos.

El análisis comparativo del efecto hipoglicemiante de los extractos de *M. oleífera*, de *S. sonchifolius*, y metformina, se realizó mediante las pruebas no paramétricas de Kruskal Wallis y test de Dunn (comparaciones múltiples). Asimismo, para medir la reducción de la glicemia pretratamiento respecto al décimo quinto día de tratamiento se utilizó la prueba no paramétrica de Wilcoxon. Se consideró significativo un valor de $p < 0,05$.

Aspectos éticos

La investigación se realizó respetando los principios de reducir el número de animales experimentales, reemplazar los animales de experimentación por otros métodos y refinar las técnicas para aminorar el sufrimiento. El protocolo fue revisado y aprobado por el Comité de Ética en Investigación para Uso de Animales (CEIPUA), del HRL (Anexo 3). Asimismo, se respetaron los principios y aspectos relacionados con el cuidado y uso de animales de laboratorio detallados en la

Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, respecto a la protección de los animales utilizados para fines científicos, y la Ley Nacional de Protección de Animales en Cautiverio (24). Al final del experimento las ratas fueron eutanasiadas con pentobarbital sódico a dosis de 100 mg/kg PV.

III.RESULTADOS

Los datos tuvieron distribución no normal. En la Tabla 1, se muestran medianas y rangos intercuartílicos de la glicemia de ratas con diabetes mellitus inducida, distribuida según grupos experimentales (control y tratamientos con *M. oleifera*, *S. sonchifolius*, y metformina).

Tabla 1. Glicemia en ratas con diabetes mellitus inducida, 15 días postratamiento con extracto acuoso de 140 mg/Kg PV *Smallanthus sonchifolius* (yacón), 200 mg/kg PV *Moringa oleifera* (moringa) y metformina 14 mg/kg pV

Grupo experimentales (N=6)	Glicemia (mg/dL)				
	Pre Tto	1 dTto	4 dTto	8 dTto	15 dTto
	Me (RIC)	Me (RIC)	Me (RIC)	Me (RIC)	Me (RIC)
Control	439 (315-565)	402 (166-469)	445.5 (402-600)	586.5 (522-600)	389 (330-512)
Metformina	522 (471-600)	331 (191-476)	271 (77-412)	127 (115-251)	107 (99-119)
<i>M. oleifera</i>	417 (341-600)	451 (378-600)	427 (417-457)	246 (170-421)	110 (104-170)
<i>S. sonchifolius</i>	398 (353-471)	268 (249-435)	298 (182-361)	134 (121-346)	117 (101-232)

Tto: Tratamiento, dTto: días con tratamiento, Me: mediana, RIC: Rangos intercuartílicos

Se observó reducción de la glicemia en los tratamientos con metformina, *M. oleifera* y *S. sonchifolius*, en 415 mg/dL, 313 mg/dL y 281,5 mg/dL; respectivamente (Tabla 2).

Tabla 2. Reducción de la glicemia en ratas con diabetes mellitus inducida y tratadas con extracto acuoso de 140 mg/Kg PV *Smallanthus sonchifolius* (yacón), 200 mg/kg PV *Moringa oleifera* (moringa) y metformina 14 mg/kg PV

Grupo experimentales	Mediana		Disminución		Valor de p*
	Pre Tto	15 dTto	mg/dL	%	
Control	439,00	389,00	50,00	11,4	0,981
Metformina	522,00	107,00	415,00	79,5	0,002
<i>M. oleifera</i>	423,00	110,00	313,00	74,0	0,009
<i>S. sonchifolius</i>	398,00	116,50	281,5	70,7	0,002

Tto: Tratamiento, dTto: días con tratamiento

*Prueba de Wilcoxon.

En el Figura 1, se visualiza la tendencia de la glicemia en los grupos experimentales, donde se observa que a medida que transcurre el tiempo, la glicemia de los tratamientos disminuye en comparación al control, quienes no recibieron tratamientos.




Figura 1. Glicemia en ratas con diabetes mellitus inducida, tratadas con 140 mg/kg PV de extracto acuoso de *S. sonchifolius* (yacón), 200 mg/kg PV de *M. oleifera* (moringa), y 14 mg/kg PV de metformina.

En cuanto a la comparación de las glicemias en los grupos tratados y control, se observó que a las 24 horas y cuarto día de tratamiento no hubo diferencia significativa ($p > 0,05$); mientras que al octavo y décimo quinto día, los tratamientos tuvieron una menor glicemia respecto al control, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (Tabla 3 y 4).

Tabla 3. Comparación de la glicemia al octavo día de tratamiento con 200 mg/kg PV *M. oleífera*, 140 mg/kg PV de *S. sonchifolius* y metformina en ratas con diabetes inducida.

Grupo	n	Medianas	Valor de p*	Comparación**
Control	6	586,5	0,015	A
Metformina	6	126,5		B
<i>M. oleífera</i>	5	246,0		B
<i>S. sonchifolius</i>	6	134,0		B

*Valor de p de Kruskal Wallis

** Letras iguales indican grupos con datos similares (test de Dunn)

Tabla 4. Comparación de la glicemia al décimo quinto día de tratamiento con 200 mg/kg PV *M. oleífera*, 140 mg/kg PV de *S. sonchifolius* y metformina, en ratas con diabetes inducida.

Grupo	n	Medianas	Valor de p*	Comparación**
Control	6	389,0	0,004	A
Metformina	6	107,0		B
<i>M. oleífera</i>	5	110,0		B
<i>S. sonchifolius</i>	6	116,5		B

*Valor de p de Kruskal Wallis

** Letras iguales indican grupos con datos similares (test de Dunn)

IV. DISCUSION

Se encontró que los extractos acuosos de *S. sonchifolius* y *M. oleifera* tuvieron efecto hipoglicemiante significativo, similar al comprobado con metformina. Al respecto, estudios previos han descrito que los extractos acuosos de hojas de yacón y moringa son frecuentemente utilizados en humanos por sus múltiples beneficios para la salud, entre los que resalta la reducción de la glucosa postprandial (18-20).

Asimismo, otro estudio encontró que la decocción de las hojas de yacón contiene compuestos fenólicos desde cafeico, clorogénico y ácidos dicaffeoilquinicos, el ácido ferúlico, el ácido pcumárico, el ácido protocatechuico y la quercetina contribuirían en su efecto hipoglicemiante inhibiendo la α -glucosidasa, promoviendo la regulación de la glucosa (19,25). Su acción hipoglicemiante también es atribuida por unirse a los receptores de insulina y potenciar la actividad de la enzima tirosinaquinasa cuya finalidad es disminuir los niveles de glucosa, además de proteger frente a las complicaciones producidas por la diabetes (18).

El efecto hipoglicemiante del extracto acuoso de yacón observado en nuestro estudio fue similar al reportado por Dos Santos et al., donde obtuvo descensos cercanos a la normalidad de los niveles de glucosa en ratas tratadas con extractos hidroetanólicos (25). Asimismo, Mejía et al. estudiaron el efecto hipoglicemiante usando raíz entera de yacón, obteniendo una menor disminución de los niveles de glucosa (27,6 mg/dL en 34 días) (26), comparado con nuestro estudio donde obtuvimos una disminución de 281,5 mg/dL en 15 días.

De igual manera, el grupo tratado con *M. oleifera* disminuyó significativamente los niveles de glicemia en comparación con el control, este resultado pudo haberse debido a su alto contenido de polifenoles y compuestos flavonoides (6,13),

glucosinolatos e isotiocianatos (27), terpenoides, quercetina y kaempferol (28) encontrados en estudios fitoquímicos anteriores, donde actúan como secretagogos de insulina y contribuyen atenuando las complicaciones diabéticas (16,28) ya que, mejoran la regeneración y viabilidad de las células destruidas; otro de sus mecanismos es reducir la gluconeogénesis y glucogenólisis hepáticas atribuido al ácido clorogénico contenido en sus hojas (28).

Nuestros resultados son congruentes con los obtenidos por estudios previos donde ratas de experimentación hiperglucémicas son tratadas con extracto de *M. oleifera* obteniendo una disminución significativa de glicemia (6,20,29).

Los extractos acuosos de *M. oleifera* y *S. sonchifolius* tuvieron similar efecto hipoglicemiante sin diferencia significativa, esto pudo deberse a que ambas plantas contienen similitud en su composición como son los polifenoles, a quienes se les atribuye propiedades hipoglicemiantes (19,25,27,28), aunque todavía no se ha establecido exactamente su mecanismo de acción, que parece ser a varios niveles. Se observó reducción de la glicemia pretratamiento con respecto al décimo quinto día de tratamiento con metformina (79,5%), tratamientos con *M. oleifera* (74%) y *S. sonchifolius* (70,7%). Estudios previos informan que grupos tratados con *M. oleifera* obtuvieron valores similares al efecto hipoglicemiante producido por la metformina (20,29). Pero no hay reportes similares con yacón y tampoco se encontraron estudios que comparen ambas PM.

El reducido tamaño de muestra fue una limitante del presente estudio, sin embargo, es usual en este tipo de diseños por aspectos éticos y logísticos, a pesar de ello, consideramos que los resultados son válidos (19,20,29,30). Otra limitación podría ser la pérdida de una unidad experimental del grupo de moringa en la mitad del experimento. El presente es un estudio preclínico que comprueba efectos

hipoglicemiantes en animales de experimentación, pero deben realizarse estudios en seres humanos que prueben estos beneficios y midan otros riesgos. Asimismo, por cuestiones logísticas, no se estudió aspectos de la fisiopatología de acción del aloxano y de los tratamientos, así como la caracterización de los fitoquímicos en los extractos.

V. CONCLUSIONES

El extracto acuoso de *Smallanthus sonchifolius* a 140 mg/kg PV y *Moringa oleifera* a 200 mg/kg PV tienen efecto hipoglicemiante sobre ratas con diabetes inducidas con aloxano.

El extracto acuoso de *Moringa oleifera* a 200 mg/kg PV y el extracto acuoso de *Smallanthus sonchifolius* a 140 mg/kg PV no presentan diferencia significativa en el efecto hipoglicemiante entre ellos.

Los extractos acuosos de *Moringa oleifera* a 200 mg/kg PV y de *Smallanthus sonchifolius* a 140 mg/kg PV presentan eficacia similar comparados con metformina a 14 mg/kg PV.

VI. RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar estudios complementarios de seguridad, donde se evalúe toxicidad y citotoxicidad, *in vitro* e *in vivo*, y posteriormente realizar estudios clínicos para comprobar si el efecto hipoglicemiante encontrado en el presente estudio es similar en seres humanos.

También se recomienda estudiar interacciones y sinergias entre los tratamientos, así como la fisiopatología de sus efectos.

FUENTES DE INFORMACIÓN

1. Organización Mundial de la Salud. Diabetes [Internet]. 2016. [citado 25 de marzo de 2018]. Disponible en: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/>
2. Organización Mundial de la Salud. Día Mundial de la Salud 2016: diabetes [Internet]. 2016. [citado 25 de marzo de 2018]. Disponible en: <http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2016/event/es/>
3. Asociación Latinoamericana de Diabetes. Guías ALAD sobre el diagnóstico, control y tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2 con medicina basada en evidencia. 2013. Revista de la Asociación Latinoamericana de la Salud [Internet]. [citado 30 de marzo de 2018]; Disponible en: https://issuu.com/alad-diabetes/docs/guias_alad_2013
4. Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú. Perú: Enfermedades no transmisibles y transmisibles, 2019. INEI. [Internet]. 2020 [citado 10 de junio de 2020]; p. 33. Disponible en: https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2019/SALUD/ENFERMEDADES_ENDES_2019.pdf
5. Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú. En el Perú 3 de cada 100 personas de 15 y más años reportan tener diabetes [Internet]. [citado 29 de marzo de 2018]. Disponible en: <https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-el-peru-3-de-cada-100-personas-de-15-y-mas-anos-reportan-tener-diabetes-8993/>
6. Omodanisi E, Aboua Y, Oguntibeju O. Assessment of the Anti-Hyperglycaemic, Anti-Inflammatory and Antioxidant Activities of the Methanol Extract of *Moringa Oleifera* in Diabetes-Induced Nephrotoxic Male Wistar Rats. *Molecules*. 2017; 22(4). DOI: 10.3390/molecules22040439
7. Guzmán-Gómez G, Arce A, Saavedra H, Rojas M, Solarte J, Mina M, et al. Adherencia al tratamiento farmacológico y control glucémico en pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2. *Alad*. 2018; 8(1):35-43. DOI: 10.24875/ALAD.18000319
8. Association American Diabetes. Pharmacologic approaches to glycemic treatment: standards of medical care in diabetes-2018. *Diabetes Care*. 2018; 41(Supplement 1):S73-85. DOI: 10.2337/dc18-S008
9. Russo D, Valentão P, Andrade PB, Fernandez EC, Milella L. Evaluation of antioxidant, antidiabetic and anticholinesterase activities of *Smilax latifolia* landraces and correlation with their phytochemical profiles. *Int J Mol Sci*. 2015; 16(8):17696-718. DOI: 10.3390/ijms160817696

10. Shah M, Keach J, Panichayupakaranant P. Antidiabetic naphthoquinones and their plant resources in Thailand. *Chem Pharm Bull.* 2018; 66(5):483-92. DOI: 10.1248/cpb.c17-00529
11. Inocente-Camones M, Guija-Poma E, Zarzosa-Norabuena E, Loja Herrera B, Ponce-Pardo J. Efecto hipoglicemiante de los extractos acuoso y etanólico de *Psidium guajava* L. (Guayaba) en ratas diabéticas inducidas por aloxano. *Horiz Med.* [Internet]. 2015 [citado 30 de marzo de 2018]; 15(2): 41-48. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-558X2015000200007&lng=es.
12. Castañeda B, Castro de la Mata R, Manrique R, Ibáñez L, Fujita R, Barnett, et al. Estudio fitoquímico y farmacológico de 4 plantas con efecto hipoglicemiante. *Horiz Med.* [Internet]. 2008 [citado 30 de marzo de 2018]; 8(1):6-34. Disponible en: https://medicina.usmp.edu.pe/medicina/horizonte/2008_1/Art1_Vol08_N1.pdf
13. Ahmad J, Khan I, Blundell R. *Moringa oleifera* and glycemic control: A review of current evidence and possible mechanisms. *Phytotherapy research.* 2019; 33(11):2841-8. DOI: 10.1002/ptr.6473
14. Chávez J, Carvallo T, González A. Identificación de compuestos agonistas a receptores involucrados en el síndrome metabólico de un extracto de hoja de *Moringa oleifera*. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. [Internet]. 2016 [citado 30 de marzo de 2018]; 1(1):6. Disponible en: <http://www.fcb.uanl.mx/IDCyTA/files/volume1/1/10/156.pdf>
15. Padilla F, Cruz J. Extractos de hojas de *Moringa oleifera* en la prevención y tratamiento de la diabetes mellitus. *Revista Cubana de Medicina Natural y Tradicional* [Internet]. 2018 [citado 18 de marzo de 2018]; 2(1). Disponible en: <http://www.revmnt.sld.cu/index.php/rmnt/article/view/39>
16. Yassa H, Tohamy A. Extract of *Moringa oleifera* leaves ameliorates streptozotocin-induced Diabetes mellitus in adult rats. *Acta Histochemica.* 2014; 116(5):844-54. DOI: 10.1016/j.acthis.2014.02.002
17. de Almeida Paula HA, Abranches MV, de Lucas Fortes Ferreira CL. Yacon (*Smallanthus sonchifolius*): a food with multiple functions. *Crit Rev Food Sci Nutr.* 2015; 55(1):32-40. DOI: 10.1080/10408398.2011.645259
18. Gordillo G, Negrón L, Zúñiga T, Flores E, Moreyra R, Fuertes C, et al. The hypoglycemic effect of aqueous extract of leaves of *Smallanthus sonchifolius* (yacon) in patients with Type 2 Diabetes Mellitus. *Ciencia e Investigación.* [Internet]. 2014 [citado 27 de marzo de 2018]; 15(1):42-7. Disponible en: <https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/farma/article/view/3193>

19. Serra-Barcellona C, Habib N, Honoré S, Sánchez S, Genta S. Enhydrin Regulates Postprandial Hyperglycemia in Diabetic Rats by Inhibition of α -Glucosidase Activity. *Plant Foods Hum Nutr.* 2017; 72(2):156-60. DOI: 10.1007/s11130-017-0600-y
20. Barreto S, Báez S, Malvetti V, Cardozo M, Gill A, Matto J, et al. *Moringa oleifera* acute effect on dexamethasone-induced hyperglycemia in Wistar rats. *An Fac Cienc Méd (Asunción).* 2016; 48(1):41-8. DOI: 10.18004/anales/2015.048(01)41-048
21. Rodríguez J, Soplapuco C. Efecto del *Smallanthus sonchifolius* sobre los niveles de glucosa e insulina plasmática en *Oryctolagus cuniculis* con diabetes inducida con aloxano [Tesis para optar el título de Médico Cirujano]. [Lambayeque]: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo; 2004. Disponible en:
22. Justil C, Angulo P, Justil H, Arroyo J. Evaluación de la actividad hipoglicemiante del extracto acuoso de *Abuta grandifolia* (Mart.) en ratas con diabetes inducida por aloxano. *Rev Inv Vet Perú.* 2015;26(2):206-12. DOI: 10.15381/rivep.v26i2.11008
23. ISO 15197: 2013 - Sistemas de prueba de diagnóstico in vitro - Requisitos para los sistemas de monitoreo de glucosa en sangre para la autoevaluación en el manejo de la diabetes mellitus [Internet]. [citado 6 de junio de 2018]. Disponible en: <https://www.iso.org/standard/54976.html>
24. Unión Europea. Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010, relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos [Internet]. 2010. Disponible en: http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=1942
25. Dos Santos KC, Bueno BG, Pereira LF, Francisqueti FV, Braz MG, Bincoletto LF, et al. Yacon (*Smallanthus sonchifolius*) leaf extract attenuates hyperglycemia and skeletal muscle oxidative stress and inflammation in diabetic rats. *Evid Based Complement Alternat Med.* 2017; 2017(9):6418048. DOI: 10.1155/2017/6418048
26. Mejía A, Zuloeta D, Palacios F. Efecto hipoglucemiante del consumo de yacón (*Smallanthus sonchifolius*) en ratones diabéticos tipo 2 inducidos con aloxano. *Revista Científica de Ciencias de la Salud.* 2016; 9(1):72-8. DOI: 10.17162/rccs.v9i1.549
27. Fahey JW, Wade KL, Stephenson KK, Shi Y, Liu H, Panjwani AA, et al. A Strategy to deliver precise oral doses of the glucosinolates or isothiocyanates from *Moringa oleifera* leaves for use in clinical studies. *Nutrients.* 2019; 11(7):1547. DOI: 10.3390/nu11071547
28. Abd El Latif A, El Bialy BES, Mahboub HD, Abd Eldaim MA. *Moringa oleifera* leaf extract ameliorates aloxan-induced diabetes in rats by regeneration of β

cells and reduction of pyruvate carboxylase expression. *Biochem Cell Biol.* 2014;92(5):413-9. DOI: 10.1139/bcb-2014-0081

29. Idakwoji P, Barnabas A, Elah S. Co-administration of ethanolic leaf extract of *Moringa oleifera* and metformin reverses polyphagia, polydipsia and stabilizes body weight in alloxan-induced diabetic rats. *Biokemistri.* [Internet]. 2015 [citado 27 de marzo de 2018]; 27(3):129-38. Disponible en: <https://www.ajol.info/index.php/biokem/article/view/133080>
30. Habib N, Serra-Barcellona C, Honoré S, Genta S, Sánchez S. Yacon roots (*Smallanthus sonchifolius*) improve oxidative stress in diabetic rats. *Pharm Biol.* 2015; 53(8):1183-93. DOI: 10.3109/13880209.2014.970285

ANEXOS

ANEXO 1

IDENTIFICACIÓN DE PLANTAS MEDICINALES

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BOTÁNICA



CERTIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE PLANTAS MEDICINALES

1. DATOS GENERALES

1.1 Muestra analizada: Muestras de especie de plantas medicinales

1.2 Lugar:

Laboratorio de botánica UNPRG

1.3 **Identificación realizada por:** Dr. César Estela Campos, profesor principal a. D. E.
Adscrito al departamento académico de botánica. F.CC.BB.

2. METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN


- Comparación de las características morfológicas de las especies muestreadas utilizadas en el experimento. Recolectadas en campo .
- Para la identificación se realizó la descripción morfológica empleado claves dicotómicas de las familias de las plantas utilizadas.
- Concepto de **Holotipo**: es el ejemplar que sirve de patrón comparativo y descriptivo de una especie. Este ejemplar es necesariamente herborizado; no puede ser un espécimen vivo o ser un cultivo (<http://www.encyclopedia.us.es/index.php/Holotipo>).

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

IDENTIFICACION DE ESPECIES UTILIZADAS EN LA INVESTIGACION

N°	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA
1	Liacón ,yacón	<i>Smallanthus sonchifolius</i> (Poepping & Engler)H. Robinson	ASTERACEAE
2	Moringa,maranto	<i>Moringa oleifera Lam.</i>	MORINGACEAE


Lambayeque, 30 Abril del 2019


.....
Dr. CESAR ESTELA CAMPOS
PROFESOR PRINCIPAL DPTO ACADEMICO
DE BOTANICA
FACULTAD .BIOLOGIA.-UNPRG

ANEXO 2

FLUXOGRAMA DEL EXPERIMENTO TRATAMIENTO

DIABETES EXPERIMENTAL



ANEXO 3

Aprobación por el Comité de Ética para uso de animales en investigación y el Comité de Ética en Investigación del Hospital Regional Lambayeque



Hospital Regional de
LAMBAYEQUE
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
COMITE DE ETICA INSTITUCIONAL PARA EL USO DE ANIMALES

CONSTANCIA DE APROBACIÓN

El Comité de Ética Institucional Para el Uso de Animales en Investigación del Hospital Regional Lambayeque, luego de haber revisado el **PROYECTO DE INVESTIGACIÓN** titulado: **"EFECTO HIPOGLICEMIANTE DEL EXTRACTO ACUOSO DE Moringa Oleifera "MORINGA" COMPARADO CON *Smalanthus soncifolius* "YACON" EN *Rattus norvegicus* var. Albina CON DIABETES MELLITUS INDUCIDA.**", presentado por:

- **SEGURA MUÑOZ DINA MARGARITA**
- **VARGAS TINEO OTTO WISLAN**

Resuelve:

1. Aprobar el uso de animales de laboratorio para la ejecución del mencionado proyecto.
2. Extender ésta constancia para que pueda ser ejecutado en las unidades operativas pertinentes.
3. El investigador deberá presentar un informe al finalizar el proyecto en mención.

Chiclayo, 07 de diciembre del 2018.



DR. VÍCTOR D. LINARES BACA
Presidente del CEIPUA





"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Chiclayo, 11 de diciembre del 2018


CONSTANCIA DE APROBACIÓN

El Departamento de Desarrollo de la Investigación Básica - Clínica de la Dirección de Investigación del Hospital Regional Lambayeque; después de considerar la factibilidad del área involucrada y de contar con la aprobación metodológica de la universidad de procedencia del Proyecto de Investigación titulado: **"Efecto hipoglicemiante del extracto acuoso de Moringa oleifera MORINGA comparado con Smalanthus soncifolius YACON en Rattus norvegicus var. Albina con Diabetes Mellitus inducida"**, presentado por:

- Segura Muñoz Dina Margarita
- Vargas Tineo Otto Wislan

Y que, habiendo cumplido con los requisitos emite una Constancia de Conformidad de Aprobación para la ejecución del mismo en área/departamento/servicio: **Dirección de Docencia, Departamento de Laboratorio de Investigación**. Dicha recolección deberá ser coordinada y supervisada por el responsable de laboratorio correspondiente. Durante el periodo **13 de diciembre del 2018 hasta el 13 de junio del 2019**.




Mg. Blanca Katiuzca Loayza Enriquez
Jefe del Departamento del Desarrollo
de la Investigación Básica - Clínica

Codigo_Inv: 0511-069-18